

ภารกิจ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

[illegible]



โรคของสัตว์ปีก ในหน้าฝน

ฝนตกชุก อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย
เสี่ยงโรคเพิ่มขึ้น!
หมั่นสังเกต อาการเร็ว รักษาได้ทัน ป้องกันได้ก่อน

1	2	3	4	5
โรคนิวคาสเซิล (Newcastle Disease)	โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza)	กาฬโรคเป็ด (Duck Plague)	โรคหลอดลมอักเสบ ติดต่อในไก่ (IB)	โรคคอกชิดอีเอส (Coccidiosis)
เกิดจากอะไร? เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล (NDV) ติดต่อโดยการหายใจ หรือกิน น้ำ อาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย	เกิดจากอะไร? เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (AI) ติดต่อโดยการหายใจ หรือกิน น้ำ อาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย	เกิดจากอะไร? เกิดจากเชื้อไวรัสกาฬโรคเป็ด (DPP) ติดต่อโดยการหายใจ หรือกิน น้ำ อาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย	เกิดจากอะไร? เกิดจากเชื้อไวรัส IB ติดต่อโดยการหายใจ หรือกิน น้ำ อาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือ สัมผัสโดยตรงกับสัตว์ป่วย	เกิดจากอะไร? เกิดจากเชื้อปรสิตคอกชิด ติดต่อโดยการกินอาหาร ที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือสัมผัส โดยตรงกับสัตว์ป่วย
อาการที่พบ • ขาทั้ง 2 ข้าง มีสีคล้ำลง • ไข่ขาว มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา	อาการที่พบ • ซึม ไม่กินอาหาร • มีไข้ ไข้สูง • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน	อาการที่พบ • ซึม ไม่กินอาหาร • มีไข้ ไข้สูง • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน	อาการที่พบ • ไข่ขาว มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา • ไข่แดง มีสีเทา	อาการที่พบ • ซึม ไม่กินอาหาร • มีไข้ ไข้สูง • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน • ขนลุก ขนชัน

แนวทางป้องกัน

- โรคติดต่อจากสัตว์ปีก
- การดูแลสุขภาพสัตว์
- การดูแลสุขภาพสัตว์
- การดูแลสุขภาพสัตว์
- การดูแลสุขภาพสัตว์

**เร่งปศุสัตว์
ทันที!**

ลดความเสี่ยงในฟาร์ม

- อย่าให้สัตว์ออกนอก
- อย่าให้น้ำดื่มสกปรก
- อย่าให้สัตว์กินอาหารสกปรก
- อย่าให้สัตว์กินอาหารสกปรก
- อย่าให้สัตว์กินอาหารสกปรก

ภาพประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองระยอง | Email: a2102@dld.go.th

ข้อควรทราบ* ในการใช้วัคซีน

อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของวัคซีนจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว
และอาจเกิดการปนเปื้อน หากไม่ปฏิบัติตามนี้

ศึกษารายละเอียด
การเก็บรักษาและการทำ
วัคซีน ตามคำแนะนำเฉพาะ
ของวัคซีนแต่ละชนิด

- วัคซีนแต่ละชนิดมีปริมาณ
วิธีใช้ และจุดฉีดต่างกัน

ให้วัคซีนแก่สัตว์
สุขภาพดีเท่านั้น

- สัตว์ต้องไม่ป่วย
ไม่เครียด

ใช้ระยะเวลา
ที่เหมาะสม

- ชนิดวัคซีนต้องเหมาะสม
กับอายุสัตว์ ต้องให้
ตามคำแนะนำ 2 ข.
- วัคซีนน้ำหรือน้ำมัน
หากใช้จนหมดแล้วเหลือให้
ทิ้งทันที

เก็บรักษาถูกต้อง

- วัคซีนทุกชนิดเก็บรักษาที่
2-8 องศาเซลเซียส
- ห้ามโดนแสงแดด
- ห้ามเก็บใกล้ช่องแช่
แข็ง และประตูตู้เย็น
(อุณหภูมิสูงเกินไป)

ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง | ที่มา: สถานปศุสัตว์แห่งชาติ

โคเนือกบินทร์บุรี

Kabinburi Beef Cattle

เป็นโคลูกผสมข้ามพันธุ์ระหว่างโคพันธุ์ซิมเมนทาลที่ เป็นโคทั้งเนื้อทั้งนม
(Dual Purpose) ที่มีการเจริญเติบโตและลักษณะชาติ ผลผลิตน้ำหนัก
ผสมกับโคพันธุ์บราห์มัน ซึ่งเป็นโคเนื้อพันธุ์ดี เป้าหมายเพื่อให้โค
เนื้อที่มีการเจริญเติบโตสูง ผลผลิตเนื้อสูง และแม่โคให้น้ำนมมาก
สามารถเลี้ยงลูกโคได้ดี และมีความทนต่อโรคและแมลงได้ดี

หน้าผากมีแต้มสี
ขาวมักเรียกว่า
“วัวหน้าแดง”

โคสายพันธุ์นี้มีการปรับตัวสูงทนต่อ
อาหารที่ยากแค้นและอาหารข้น
ได้ดี เหมาะสำหรับการทำเนื้อโคขุน
ระดับพรีเมียม มีการเติบโตเร็ว
ซากมีขนาดใหญ่

สามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ทาง Facebook ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
โทรศัพท์ : 038-027901, 089-891-4123
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง หมู่ 6 ตำบลแม่โค อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง 21140



รู้ทัน โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

1. การเกิดโรค (How it happens)

- เชื้อไวรัสอยู่ในน้ำลายสัตว์



- ติดต่อผ่านการกัดหรือ ข่วน



- เมื่อสัตว์ป่วยจะแพร่เชื้อก่อนมีอาการ



2. การป้องกันโรค (Prevention)

- พามาฉีดวัคซีนทุกปี



- ไม่เลี้ยงปล่อย



- หลีกเลี่ยงสัตว์แปลกหน้า



3. สังเกตอาการสัตว์ป่วย (Observe sick animal symptoms)

- ซึมเศร้า หรือ ก้าวร้าวผิดปกติ



- กลืนน้ำ กินน้ำยาก



- อ้าปากค้าง มีน้ำลายยืดเยอะ



- กล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินเซ



**หากสัตว์มีอาการเหล่านี้ หรือสงสัยว่าติดเชื้อ ให้รีบแจ้ง
ปศุสัตว์อำเภอ/เขต**



"เตือนภัย! ปากเท้าเปื่อยสายพันธุ์ใหม่ 'SAT 1' วัคซีนเดิมเอาไม่อยู่ เช็ควิธีป้องกันด่วน!"



ปีโซสุก น้ำลายไหล แผลที่ปาก ผื่นขึ้นตามตัว

กินเป็นแผล คันที่หู ปากโต เดินเซ หกล้ม

อื่น

ทำไมวัคซีนเดิมถึงป้องกันไม่ได้?



สายพันธุ์เดิม (O, A, ASIA 1)

ใช้กันมานาน



สายพันธุ์ใหม่ (SAT 1)

ไม่ป้องกันจากสายพันธุ์

4 ช่องทางหลักที่เชื้อเข้าสู่ฟาร์ม



สัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรง



กับอาหารปนเปื้อน



ติดมากับรถ/คน



แพร่กระจายทางอากาศ

สูตรปฏิบัติ 1-2-3 เมื่อพบสัตว์ป่วย

1.

แยกสัตว์ป่วย ห้ามจับสัตว์ป่วย หรือเคลื่อนย้ายเด็ดขาด
2.

ห้ามบุคคลหรือรถบรรทุก ภายนอกเข้าฟาร์ม
3.

แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ภายใน 12 ชั่วโมง

บกลงโทษและสิทธิประโยชน์

สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่วย

- สักลอบเคลื่อนย้ายหรือขายสัตว์ป่วย โทษสูงสุดปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งปรับและจำคุก

- แจ้งขอ ช่วยระงับโรค มีสิทธิรับเงิน ชดเชยหากทำตามขั้นตอน

สายด่วนแจ้งเหตุ 063-225-6888

ติดต่อกรมปศุสัตว์ทันทีเมื่อสงสัยว่าสัตว์ป่วย

การฆ่าเชื้อเบื้องต้นที่ทำได้เอง

วัตถุประสิทธิ	น้ำยาฆ่าเชื้อ	อัตราส่วน
ฟาร์ม/คอก	โซดาไฟ	100-200 กรัม ต่อ น้ำ 10 ลิตร
พื้นคอกและสัตว์	โซดาไฟ	400 กรัม ต่อ น้ำ 10 ลิตร
เสื้อผ้าและรองเท้า	น้ำยาฆ่าเชื้อ (4-6%)	ฉีดพ่นหรือเช็ด ไม่ต้องผสมน้ำ



ทำไมต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ

สำหรับโรงเรือนสัตว์ปีก

1 ลดการเกิดโรค

ช่วยฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์ปีก

2 ลดการแพร่กระจายของโรค

ลดการปนเปื้อนและการแพร่เชื้อจากการสัมผัส อากาศ มูลสัตว์ น้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ

3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ทำให้โรงเรือนสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์อยู่สบาย ลดความเครียด เจริญเติบโต

4 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

✓ สัตว์แข็งแรง
 ✓ อัตราการรอดสูง
 ✓ การเจริญเติบโตดี
 ✓ ให้ผลผลิตมากขึ้น

5 ลดความเสียหายและต้นทุน

ลดการสูญเสียจากโรคระบาด ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และเพิ่มกำไรให้ฟาร์ม



ใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพดี ฟาร์มปลอดภัย ได้ผลผลิตคุ้มค่า

ภาพประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ A2107@DLD.GO.TH



4 โรคอันตรายจาก "วัว" สู่ "คน": รู้ทันความเสี่ยงและวิธีป้องกัน

โรคติดต่อสำคัญ 4 ชนิดที่แพร่กระจายจากโคสู่คนผ่านการสัมผัสหรือบริโภค ได้แก่ โรคแอนแทรกซ์, โรควัวบ้า, โรคแท้งติดต่อ และวัณโรค พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อ

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic Diseases)

- แพร่เชื้อผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วย สารคัดหลั่ง หรือการบริโภคเนื้อและผลิตภัณฑ์นมดิบ
- อาการเด่นชัดที่ควรสังเกต: เริ่มตั้งแต่แผลดำที่ผิวหนัง ไข้สูงเรื้อรัง จนถึงอาการทางระบบประสาทที่รุนแรง



4 แนวทางป้องกันและลดความเสี่ยง



กินสุกและเลือกดื่มนมพาสเจอร์ไรส์

หลีกเลี่ยงนมดิบ เช่น ลาบดิบ หรืออออจี และดื่มนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้น



แอนแทรกซ์ (Anthrax)

การติดต่อ: สัมผัสสัตว์ตายผ่านบาดแผล หายใจเอาสปอร์เข้าไป/กินเนื้อดิบ



อาการ: มีตุ่ม บวม แดงเป็นแผลดำตรงกลาง มีไข้ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก



โรควัวบ้า (BSE)

การติดต่อ: กินเนื้อหรือเนื้อเยื่อ ระบบประสาทที่มีเชื้อปนเปื้อน



อาการ: ส่งผลต่อระบบประสาท สูญเสียการทรงตัว ความจำเสื่อม ระบบประสาทถูกทำลาย



แท้งติดต่อ (Brucellosis)

การติดต่อ: ดื่มนมดิบ/สัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น สก หรือลูกโคแท้ง



อาการ: มีไข้สูง หววนเวียน ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ



วัณโรค (Tuberculosis)

การติดต่อ: ดื่มนมดิบ/สูดละอองฝอยที่มีเชื้อจากโคที่เป็นโรค



อาการ: ไอเรื้อรัง เสมหะปนเลือด เจ็บหน้าอก น้ำหนักลด



สวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อสัมผัสสัตว์

เกษตรกรควรใส่ถุงมือ เสื้อผ้าที่รัดกุม และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์



ห้ามฆ่าและสัตว์ที่ตายผิดปกติ หากพบสัตว์ป่วย ตายผิดปกติ ให้แจ้งปศุสัตว์ทันที ห้ามนำมานรีโรคเด็ดขาด

จัดทำโดย: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย

2105@dld.go.th




ความรู้เรื่องโรคเมลิออยโดซิส (Melioidosis) ในปศุสัตว์



? คืออะไร?

โรคติดเชื้อแบคทีเรีย (Burkholderia pseudomallei)



อาการในปศุสัตว์

เฉียบพลัน:

ไข้สูง หายใจลำบาก ตายรวดเร็ว



เรื้อรัง:


เกิดฝีหนองตามร่างกาย (เช่น ที่ปอด ต่อม้ำเหลือง ข้ออักเสบ) ผอมแห้ง



การติดต่อสู่สัตว์

- สัมผัสดิน/น้ำที่มีเชื้อโดยตรง
- กินน้ำ/อาหารปนเปื้อน
- หายใจเอาฝุ่นละอองที่มีเชื้อ

ระวัง! ติดต่อสู่คน



ระวัง! ติดต่อสู่คน



การป้องกัน



สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย

จัดทำโดย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)

สำหรับฟาร์มสัตว์ปีกคู่ เพื่อป้องกัน โรคปากและเท้าเปื่อยทุกสายพันธุ์

โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เป็นโรคไวรัสที่ระบาดได้รวดเร็ว รุนแรง
ป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัด

1 ควบคุมการเข้า-ออกฟาร์ม

- จำกัดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าในฟาร์ม
- จัดทำทะเบียนผู้เข้า-ออก
- สวมชุดและรองเท้าบูทเฉพาะในฟาร์ม

2 ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

- ทำความสะอาดคอก โรงเรือน อุปกรณ์ และยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ
- ใช้สารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำ

3 แยกสัตว์ป่วยและสังเกตอาการ

- สังเกตอาการสัตว์ทุกวัน เช่น น้ำลายไหล ชีบ จ้ำปาก เจริบกับ
- หากพบสัตว์ป่วยให้แยกออกจากฝูงทันที

ป้องกันวันนี้ ปลอดภัยทั้งฟาร์ม
ไม่เสี่ยงโรคปากและเท้าเปื่อยทุกสายพันธุ์

ฟาร์มปลอดโรค เริ่มต้นที่เรา

4 ควบคุมยานพาหนะ

- จำกัดยานพาหนะเข้าในฟาร์มเท่าที่จำเป็น
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อล้อรถทุกครั้งก่อนเข้า-ออก

5 จัดการอาหาร น้ำ และวัสดุปรองพ่น

- ใช้ใบและอาหารที่สะอาด
- เก็บอาหารในที่มิดชิด
- วัสดุปรองพ่นต้องแห้งและเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

6 ป้องกันสัตว์พาหะและแมลง

- ควบคุมหนู แมลง และสัตว์พาหะต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามาในฟาร์ม

หากพบสัตว์ต้องสงสัย

- มีแผลในปาก เท้า เติมน้ำ
- น้ำลายไหล เติมน้ำ เติมน้ำ

รับแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที
อย่าปกปิดข้อมูล เพื่อให้ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องทำ Biosecurity ?

- ลดความเสี่ยงการนำเข้าพาหะ
- ลดการแพร่กระจายของโรค
- ปกป้องสุขภาพสัตว์ เพิ่มผลผลิต
- ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ร่วมมือ ร่วมใจ
ยกระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ
หยุดโรคปากและเท้าเปื่อยทุกสายพันธุ์
เพื่อฟาร์มของเรา...ที่ยั่งยืน

เพิ่มเติม !

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
- กำจัดมูลสัตว์และขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
- บันทึกข้อมูลการเลี้ยงและการเข้า-ออกฟาร์ม
- อบรมความรู้และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

จัดทำโดย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์

เกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อพร้อมรับมือภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์

1 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

- เกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่เลี้ยง
- หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์

<https://eregist.dld.go.th/>

3 จัดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่รอบโรงเรือน

- เลือกใช้ยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพและเจือจางน้ำยาตามคำแนะนำของแต่ละผลิตภัณฑ์
- เพื่อลดเชื้อโรคภายในฟาร์ม

2 สัตว์ต้องได้รับวัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ป้องกันปรสิตภายนอก สม่าเสมอ

- กรณี โคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ ฉีดวัคซีน FMD ทุก 6 เดือน
- กรณีสัตว์ปีก ทำวัคซีน ND/IB ทุก 3 เดือน
- ถ่ายพยาธิทุก 3-6 เดือน
- ฉีดหรือพ่นยาป้องกันปรสิตดูดเลือดภายนอก

4 สำรองเสบียงอาหารสัตว์

- เพื่อให้สัตว์มีอาหารสำรองกรณีฉุกเฉิน เช่น พาง อาหารสำเร็จรูป

5 ตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

- หากโรงเรือนชำรุด ไม่มั่นคง ควรเร่งซ่อมแซมโรงเรือน

เตรียมพร้อมวันนี้ ปกป้องสัตว์เลี้ยง ฟาร์มปลอดภัย เกษตรกรอุ่นใจ

DLD-C RAYONG
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

<https://pvlo-ray.dld.go.th>

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดระยอง

Tns. 0 3868 6644

รู้ทัน ป้องกันภัย โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

เกิดจากเชื้อไวรัส

- อันตรายถึงชีวิต
- ติดต่อจากการถูกกัด ข่วน เลีย

อาการที่ต้องระวัง

ในสัตว์

เกรี้ยวกราด น้ำลายไหล อัมพาต

ในคน

ปวดศีรษะ กลืนลำบาก กลืนน้ำ กลืนลม

เมื่อโดนกัด/ข่วน: “ล้างแผล ใส่ยา หาหมอ กักสัตว์”

ล้างแผลด้วยสบู่
น้ำสะอาด 15 นาที

ใส่ยาฆ่าเชื้อ

พบแพทย์ทันที
เพื่อรับวัคซีน

กักสัตว์ 10 วัน

สัตว์ที่เป็นพาหะ

สุนัข

แมว

ค้างคาว

หมู

รวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ

วิธีป้องกัน “4 อย่า + 1 จัด”

อย่าเหยียบ
อย่าแหย่

อย่าหยิบ
อย่าแยก

อย่าแหย่
จัดวัคซีน
สัตว์เลี้ยงทุกปี

ด้านกักกันสัตว์ชลบุรี

โรคปากและเท้าเปื่อย

สายพันธุ์ SAT1 (Serotype Asia 1)

เกิดจากเชื้อไวรัส Foot-and-Mouth Disease Virus (FMDV)
SAT1 เป็นหนึ่งในสายพันธุ์หรือซีโรไทป์ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย
เป็นโรคติดต่อรุนแรงในสัตว์กับคู่

อาการสำคัญ

- ไข้ขึ้น เนื่องจาก
- น้ำลายไหลมาก
- มีแผลหรือตุ่มบริเวณปาก ลิ้น เหงือก
- มีแผลหรือตุ่มบริเวณเท้า
- เจ็บเคี้ยวหรือไม่ยอมเคี้ยว
- กินอาหารได้น้อย น้ำหนักลด

! ลูกสัตว์อายุน้อยอาจมีอาการรุนแรง อัตราการตายสูงได้ในบางราย

การแพร่กระจาย

เชื้อแพร่ได้ง่ายมาก ผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น

สัมผัสสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เพิ่งหายป่วย

น้ำลาย น้ำูก สารคัดหลั่ง

อุจจาระ ปัสสาวะของสัตว์ป่วย

อาหาร น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ

คน เสื้อผ้า รองเท้า

อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ

สามารถแพร่ผ่านอากาศได้ในบางสถานการณ์ โดยเฉพาะระยะใกล้ ๆ

สัตว์ที่ติดเชื้อ

โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์กับคู่อื่น ๆ

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อไวรัส Foot-and-Mouth Disease Virus (FMDV) ในกลุ่ม Southern African Territories (SAT) – SAT1

ผลกระทบ

- สัตว์เจ็บป่วย ปานกลาง
- ผลผลิตน้ำนม และเนื้อสัตว์ลดลง
- เกษตรกรเสียหายได้
- การส่งออกสัตว์และผลิตภัณฑ์ถูกจำกัด

รู้หรือไม่?

SAT1 ไม่ใช่เชื้อโรคใหม่ แต่เป็น “ซีโรไทป์” ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย เชื้อแต่ละซีโรไทป์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ป้องกันซีโรไทป์หนึ่งอาจไม่สามารถป้องกันอีกซีโรไทป์ได้ทั้งหมด

ดังนั้น การพบ SAT1 จึงมีความสำคัญต่อการเฝ้าระวังและการเลือกวัคซีนให้เหมาะสม

การป้องกัน “ป้องกันก่อนระบาด ลดการแพร่เชื้อ”

ฉีดวัคซีนตามโปรแกรมของภาครัฐ

แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อคอกและอุปกรณ์

จำกัดการเคลื่อนย้ายสัตว์

ไม่ซื้อหรือนำสัตว์จากพื้นที่ที่มีการระบาดเข้าฝูง

เฝ้าระวังอาการสัตว์อย่างสม่ำเสมอ

หากพบสัตว์สงสัยป่วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

ด้านกักกันสัตว์ชลบุรี ติดต่อ **039387163**

